

Avertissements agricoles



Bulletin n° 25 du 1er octobre 1986

Numérotation continue : n° 25

COLZA :

- . Altises : attendre
- . Desherbage de post-levée

CEREALES :

- . Jaunisse nanisante : attention aux semis très précoces

COLZA :

Le colza est généralement entre les stades 2 et 4 feuilles vraies ; l'état sanitaire et les levées sont satisfaisants.

- Grosses altises :

Les captures restent faibles sur l'ensemble de la Lorraine et le colza est, dans la majorité des situations, à l'abri de dégâts provoqués par les morsures d'adultes.

Il faut cependant continuer à observer cet insecte dont les larves peuvent occasionner des dégâts durant l'automne et l'hiver. L'efficacité des traitements contre les larves étant plus aléatoire, il est préférable de détruire les adultes en cas de vol important.

- . Préconisations : Continuer à surveiller les cuvettes jaunes et intervenir en cas de captures importantes (à partir du stade 3 feuilles : 20 à 30 captures cumulées).

- Desherbage de post-levée :

Les produits utilisables sont essentiellement des antigraminées (sauf pour le LONTREL SF 100) avec pour certains une action anticotylédones intéressante (PRADONE TS, KERB ULTRA) : se reporter au tableau de la page 3.

Imprimerie de la Station de Recherches NANCY

Directeur-Général D. VERBEKE

Publication Périodique :

CPPAP N° 1848 2011 AD

Abonnement annuel 110,150 F

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative

54043 NANCY CEDEX

Tél : (8) 337.26.45.



P38

CEREALES :

La plupart des orges sont semées, quelques unes sont levées et se trouvent au stade 1 à 2 feuilles (semis antérieurs au 15 septembre). Les premiers blés type Arminda commencent à être emblavés.

- Jaunisse nanisante :

Un réseau de surveillance des pucerons est en place et nous vous tiendrons informés dans nos prochains bulletins des risques éventuels encourus à la suite des pullulations d'insectes vecteurs.

D'ores et déjà, quelques précautions peuvent être prises :

- Destruction rapide des graminées et repousses dans les parcelles de colza,
- Retournement ou destruction des repousses dans les chaumes de blé et orge (parcelles destinées à être ensemencées au printemps),
- Surveillance des parcelles déjà levées surtout si elles se situent à proximité de champs de maïs.

Nous vous rappelons que dans nos essais des années antérieures, des populations de pucerons se situant entre 25 et 30 % de pieds colonisés n'avaient eu aucune répercussion sur les rendements.

Les produits actuellement homologués contre les pucerons à l'automne sont les suivants :

. alphaséthane	FASTAC	0,2 l/ha
. bromopos	NEXION 25	1,5 l/ha
. cyflutrine	BAYTHROID	0,3 l/ha
. cyperméthrine	CYMBUSH	0,2 l/ha
	KAFIL SUPER	0,2 l/ha
	MASTOR	0,4 l/ha
	SHERPA 10	0,25 l/ha
. deltaméthrine	DECIS CE	0,3 l/ha
. fenvalérate	SUMICIDIN 10	0,25 l/ha
. fluvalinate	MAVRIK	0,2 l/ha
. biphenthrine	TALSTAR	0,075 l/ha
. cyalothrine	KARATE	0,15 l/ha

RAPPEL : N'oubliez pas de surveiller les limaces.

Matière active	Spécialité Commerciale	Dose/ha de spécialité	
carbétamide	LEGURAME PM	3 kg	<ul style="list-style-type: none"> Depuis le stade 4 feuilles (B4) du colza jusqu'à 3 semaines avant la reprise de végétation. Application possible sur sol gelé. Bonne action sur graminées. Insuffisante sur dicotylédones. <p>5 à 6 kg contre chiendent de novembre à fin janvier</p>
propyzamide	KERB 50 W	1,5 kg	<ul style="list-style-type: none"> A partir du stade 3 feuilles vraies du colza (B3) jusqu'à 3 semaines avant la reprise de végétation. Application possible sur sol gelé. Bonne action sur graminées. Insuffisante sur dicotylédones <p>2 kg contre avoine à chapelet 3 kg contre chiendent</p>
propyzamide + diuron	KERB ULTRA	1,2 kg	<ul style="list-style-type: none"> A partir du stade 4 feuilles vraies bien développées, 6ème feuille naissante des colzas sains bien implantés. De préférence avant l'hiver. Bonne action sur graminées Action limitante sur Sanves, Ravenelles.
carbétamide + diméfuron	PRADONE TS	3,5 kg - 4 kg	<ul style="list-style-type: none"> A partir du stade 6 feuilles vraies (B6) des colzas sains et bien implantés. Application possible sur sol gelé. Bonne action sur graminées (dont repousses de céréales) Une action sur dicotylédones : Efficace sur : Véroniques, Mourons, Céraistes, coquelicot Irrégulier sur : Matricaires, gaillets
alloxydime-sodium	FERVIN + Huile	1 kg + 3 l. huile	<ul style="list-style-type: none"> Quel que soit le stade du colza. De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec). Action essentiellement sur graminées (sauf Paturin) <p>1,0 à 1,25 kg + 3 l. huile contre graminées vivaces.</p>
clopyralid (3.6. DCP)	LONTREL SF 100	1 à 1,2 l	<ul style="list-style-type: none"> Quel que soit le stade du colza Adventices bien développées (stade boutons), températures à 10° Action sur dicotylédones : matricaires, anthémis, lampsanne, chardons, laitillons, gesses
sethoxydime	FERVINAL	2 l. + 3 l. huile	<ul style="list-style-type: none"> Quel que soit le stade du colza De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec) Action essentiellement sur graminées (sauf Paturin) <p>3,0 l. + 3,0 l. huile Schering contre graminées vivaces</p>
fluazifop-p-butyl	FUSILADE X 2 + AGRAL	0,7 l. + 0,1 % vol. bouill.	<ul style="list-style-type: none"> Quel que soit le stade du colza. De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec) Action essentiellement sur graminées (sauf Paturin) <p>1,5 l. + Agram (0,1 %) contre graminées vivaces.</p>
haloxyfop-éthyl	GALLANT	1,0 l.	<ul style="list-style-type: none"> Quel que soit le stade du colza De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. Uniquement à l'automne Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec). Action essentiellement sur graminées <p>2,0 l. contre graminées vivaces et Paturin</p>
quizalofop-éthyl	TARGA + huile	1,25 l. + 2,0 l.	<ul style="list-style-type: none"> Quel que soit le stade du colza De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec) Action essentiellement sur graminées (sauf Paturin) <p>3,0 l. + 2,0 l. huile Schering contre graminées vivaces.</p>